



# Grandes Cultures

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 08-11-20018064

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bulletins techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 8 du 02 Juin 1999  
Rédigé en collaboration avec la Ferme de Loudes et la Chambre d'Agriculture

### CEREALES

Les cultures ont achevé la floraison et démarré leur maturation.

Quelques symptômes de **Fusariose** (épillets desséchés avec coussinets rosés, à ne pas confondre avec des épillets vides avortés, entièrement blancs et secs) sont visibles sur épis dans nos parcelles non traitées suite aux périodes de contamination des semaines passées.

Les traitements conseillés dans notre précédent bulletin en plus de la couverture de ce risque (en respectant stade d'intervention et doses d'utilisation) ont permis d'assurer une protection sur de nouvelles manifestations de la **Rouille Brune** sur les feuilles supérieures qui restent bien vertes.

La **Septoriose** est toujours présente sur F2 et a peu évoluée vers la F1

### TOURNESOL

Les périodes de semis ont été très échelonnées, de ce fait les stades sont très variables, allant de 2 à 8 feuilles; des contaminations de **Phomopsis** ont déjà eu lieu; de prochaines pluies ne pourront que les renforcer.

Les variétés sensibles et oléiques doivent être conduites avec une protection double compte tenu de leur sensibilité; intervenez pour ces cultures au stade 8-10 feuilles et renouvelez au stade limite passage tracteur en même temps que les autres variétés avec:

**GORGONE** 2 L/Ha  
**PUNCH CS** 0.8 L

A l'occasion de ces traitements fongicides vous pouvez réaliser un apport de bore; consultez votre technicien; utilisez  
**MULTILEO 2 L/Ha**

### TOURNESOL - SOJA

Attention aux limaces; compte tenu des conditions favorables ce ravageur a causé d'importants dégâts et est très présent y compris sur des parcelles déjà protégées; surveillez vos parcelles et n'hésitez pas à intervenir ou renouveler avec **METAREX 7 Kg/Ha en plein ou en localisé à 5 Kg**

### MAIS CONSO.

Le vol de **Sésamie** à démarré depuis la mi-mai avec des prises variables selon les secteurs (plus importantes dans la partie Est de la zone).

Les maïs sont à des stades allant de 2-3 feuilles à 5-6 feuilles; n'intervenez que pour les parcelles non protégées gauchou ou pour les cultures enrobées gauchou mais ayant atteint le stade 5-6 feuilles.

Il est préférable de réaliser 2 applications à demi-dose assurant une meilleure couverture du vol souvent assez long dans notre région sur des cultures ayant une masse végétative encore peu importante; par contre soignez votre pulvérisation pour la concentrer sur les rangs de maïs.

Intervenez avec:

**DECIS** 0.8 L

**KARATE Vert** 0.3 L

**BAYTHROID** 0.8 L

**TALSTAR** 0.2 L

Ce traitement sera à renouveler 15 jours après

### TOURNESOL:

**Phomopsis**  
Variétés sensibles et oléiques  
intervenez au stade 8-10 feuilles

### MAIS CONSO:

**Sésamie protection**  
demi-dose à 15 jours d'intervalle

### TOURNESOL et SOJA

Attention aux limaces

DRAF  
Service Régional de la  
protection des  
Végétaux  
ZAC D'ALCO-BP3056  
34034 MONTPELLIER  
CEDEX 01  
Tél: 04.67.10.19.50  
Fax: 04.67.03.10.21

Antenne Carcassonne  
Chemin de la Jasso  
Plaine Mayrevielle  
11000 CARCASSONNE  
Tél: 04.68.71.18.58  
Fax: 04.68.47.46.45

Imprimé à la station  
d'Avertissements  
Agricoles de Languedoc  
Roussillon  
Directeur gérant:  
M.FREYDIER  
Publication périodique  
C.P.P.A.P. N° 531 AD  
ISSN N° 0298-6582